


## Nicht-Pieks-Bogen



**Dieser Bogen kann den Blutabnahmepieks vor Operationen verhindern....**

### Fragen zum Kind:

1. Hat Ihr Kind vermehrt Nasenbluten ohne erkennbaren Grund?  Ja  Nein
2. Treten bei ihrem Kind vermehrt „blaue Flecke“ auf, auch an ungewöhnlichen Stellen?  Ja  Nein
3. Haben Sie Zahnfleischbluten ohne erkennbare Ursache festgestellt?  Ja  Nein
4. Wenn ihr Kind schon einmal operiert wurde, kam es während oder nach einer Operation zu längerem oder verstärktem Nachbluten?  Ja  Nein
5. Kam es beim Zahnwechsel oder nach dem Ziehen von Zähnen zu längerem oder verstärktem Nachbluten?  Ja  Nein
6. Hat Ihr Kind schon einmal Blutkonserven oder Blutprodukte übertragen bekommen?  Ja  Nein
7. Hat Ihr Kind in den letzten Tagen Schmerzmittel, zum Beispiel Aspirin, ASS oder Ähnliches genommen?  Ja  Nein

### Fragen an beide Eltern (mit „Ja“ ankreuzen, wenn es bei einem der Elternteile zutrifft!)

1. Haben Sie vermehrt Nasen- oder Zahnfleischbluten, auch ohne erkennbaren Grund?  Ja  Nein
2. Haben Sie den Eindruck, dass es bei Schnittwunden (Rasieren) nachblutet?  Ja  Nein
3. Gab es bei Ihnen längere oder verstärkte Nachblutungen nach Operationen oder beim Ziehen von Zähnen?  Ja  Nein
4. Haben Sie schon einmal bei Operationen Blutkonserven erhalten?  Ja  Nein
5. Gibt es oder gab es in Ihrer Familie Fälle von vermehrter Blutungsneigung?  Ja  Nein

### Zusatzfragen an die Mutter:

6. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Regelblutung verlängert oder verstärkt ist?  Ja  Nein
7. Kam es bei oder nach Geburt eines Kindes zu verstärkten Blutungen?  Ja  Nein

**Kinder dürfen vor einer Operation 6 Stunden lang weder Essen noch Trinken.  
Allenfalls ist Tee (ohne Milch)/Sprudel bis maximal 3 Stunden vor der Operation erlaubt.**